

НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО:



Вакцинация «Гам-КОВИД-Вак» - комбинированной векторной вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 проводится в два этапа:

I компонент (число, месяц, год) _____

II компонент (число, месяц, год) _____

ВАКЦИНАЦИЯ COVID-19 НЕ ОТМЕНЯЕТ для привитого пациента необходимость носить маски и перчатки, а так же соблюдать социальную дистанцию.

По рекомендациям МЗ РФ Стандартная операционная процедура
«Порядок проведения вакцинации против COVID-19
взрослому населению»

Департамент здравоохранения Курганской области
ГКУ «Курганский областной центр общественного здоровья и
медицинской профилактики»



Памятка пациента
о проведении вакцинации
против COVID-19
вакциной «Гам-КОВИД-Вак»




г. Курган, 2021 г.


Уважаемый пациент!

Ваше крепкое здоровье – наша главная цель! А для того, чтобы полностью реализовать наш потенциал в достижении главной цели, мы просим Вас соблюдать некоторые (основные и важные) правила, которые помогут нам в нашей работе:


 Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и переболевшие, у кого с момента выздоровления прошло более 6 месяцев.


 Противопоказаниями к вакцинации являются:


- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.

 Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр врача с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева на основании которых врач-специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.

Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.

 Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно. На 21 день вводят компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно.

 В течение 30 минут после вакцинации просим Вас оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.

 После проведения вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течение трёх последующих дней кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность) реакции.

Реже отмечается тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.

Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации:

- ✓ не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок;
- ✓ при покраснении, отёчности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства;
- ✓ при повышении температуры тела после вакцинации принять нестероидные противовоспалительные средства.